

QUESTIONARIO

2


ASL Città di Torino

Concorso pubblico in forma associata, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 20 posti di Operatore Socio Sanitario
(cat. Bs) - con turnazione a copertura delle 24 ore

NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga
dato il segnale di inizio della prova

VERSIONE QUESTIONARIO



0038000003



**INCOLLARE SUL
MODULO RISPOSTE
IL CODICE A BARRE
A FIANCO**

Questionario 0038000003

1. Le precauzioni standard sono rivolte:

- A. Solo ai pazienti con malattia infettiva in corso
- B. A tutti i pazienti con basse difese immunitarie
- C. A tutti i pazienti che ricevono assistenza in ambito sanitario senza considerare la loro diagnosi o il loro presunto stato infettivo

2. Il lavaggio delle mani:

- A. si può evitare se si utilizzano i guanti
- B. va fatto solo prima di indossare i guanti
- C. è la principale manovra da mettere in atto per prevenire le Infezioni correlate all'assistenza (I.C.A.)

3. Il lavaggio chirurgico delle mani è?

- A. E' una procedura che ha lo scopo di prevenire la contaminazione del campo chirurgico e l'insorgenza di infezioni chirurgiche post-intervento eliminando la flora transitoria e riducendo quella residente presente sulla cute delle mani
- B. E' una procedura che ha lo scopo di rimuovere la flora batterica residente dalla cute delle mani. Esso è indicato nella maggior parte delle attività routinarie
- C. E' una procedura che ha lo scopo di rimuovere la flora batterica transitoria dalla cute delle mani. Esso è indicato nelle procedure di assistenza specifiche

4. Quale di queste affermazioni è corretta:

- A. la tipologia dei guanti va scelta in base alle operazioni che l'operatore deve andare a svolgere
- B. la tipologia dei guanti va scelta in base al tipo di paziente sul quale vado a operare
- C. la tipologia dei guanti va scelta in base al loro costo economico

5. Quale tra le seguenti affermazioni sulla frizione idroalcolica è corretta?

- A. Si deve fare quando le mani sono visibilmente sporche
- B. La frizione idroalcolica sostituisce il lavaggio delle mani
- C. La durata della frizione deve essere di 20/30 secondi e non deve essere utilizzata se le mani sono visibilmente sporche

6. La clorexidina è:

- A. un ottimo disinfettante anche contro le spore
- B. un ottimo disinfettante attivo contro i virus
- C. un ottimo disinfettante attivo contro i batteri Gram-negativi e Gram-positivi

7. Qual è la definizione corretta di "detersione"?

- A. E' la rimozione meccanica di materiale organico e non, da superfici ed oggetti eseguita con l'impiego di acqua e detergente
- B. E' una procedura da mettere in atto in caso di contaminazione di superfici o oggetti con sangue o altri liquidi biologici potenzialmente infetti per il loro precedente utilizzo
- C. E' il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni

8. Qual è la definizione corretta di "decontaminazione"?

- A. E' il processo preliminare alla detersione, disinfezione e sterilizzazione di oggetti contaminati da materiale organico, definito come una procedura atta a ridurre drasticamente la carica batterica
- B. E' il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni
- C. E' la rimozione meccanica di materiale organico e non, da superfici ed oggetti eseguita con l'impiego di acqua con o senza detergente

9. Tutti i rifiuti che sono contaminati da sangue visibile, liquidi corporei provenienti da pazienti con malattie infettive trasmissibili attraverso secrezioni e i rifiuti contenenti liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, pleurico, sinoviale, amniotico, peritoneale ... sono compresi:

- A. nei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
- B. nei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo
- C. nei rifiuti sanitari non pericolosi

10. I containers di metallo (acciaio, alluminio) possono essere utilizzati solo per una delle seguenti metodiche di sterilizzazione:

- A. autoclave a vapore
- B. sterilizzazione con acido peracetico
- C. sterilizzazione a gas plasma

11. Nella misurazione con il termometro timpanico la sonda deve essere introdotta nel condotto auricolare con cautela tirando:

- A. il lobo dell'orecchio in avanti e verso l'alto
- B. il lobo dell'orecchio indietro e verso il basso
- C. il lobo dell'orecchio indietro e verso l'alto

12. Ogni azione della procedura del BLS è preceduta da una fase di valutazione seguendo la sequenza:

- A. valutazione dell'attività respiratoria - valutazione della presenza di attività cardiaca - valutazione dello stato di coscienza
- B. valutazione dello stato di coscienza- valutazione della presenza di attività respiratoria- valutazione della presenza di attività cardiaca
- C. valutazione dello stato di coscienza - valutazione della presenza di attività cardiaca - valutazione dell'attività respiratoria

13. La posizione di sicurezza del paziente è indicata in caso di:

- A. perdita di coscienza
- B. traumi degli arti inferiori
- C. infarto miocardico acuto

14. Che cos'è la manovra di Heimlich?

- A. una tecnica di riabilitazione postoperatoria
- B. una modalità diagnostica adoperata per i pazienti allettati
- C. una tecnica di primo soccorso per liberare le vie aeree

15. Invitare la persona ad urinare prima di procedere alla rilevazione del peso corporeo:

- A. è indicato
- B. è suggerito, ma non è strettamente indispensabile
- C. non è indicato

16. Se l'Infermiere assegna all'OSS il compito di effettuare un'iniezione sottocutanea, cosa deve fare l'OSS?

- A. rifiutare la prestazione in quanto non rientra nelle sue competenze
- B. effettuare l'iniezione dopo aver verificato la prescrizione infermieristica e solo in caso di necessità (poco personale presente)
- C. effettua l'iniezione solo se è esperto di tale manovra, in caso contrario deve astenersi dalle prestazioni

17. Come si deve comportare un OSS di fronte a un paziente che nell'immediato post-operatorio presenta pallore, tachicardia e affanno?

- A. chiamo immediatamente l'infermiere, potrebbe essere una complicanza dell'intervento
- B. rilevo subito i parametri vitali e poi chiamo il medico
- C. lo aiuto a posizionarsi semiseduto e gli somministro acqua da bere

18. Nell'igiene dei genitali nella donna si deve procedere:

- A. Dalla regione pubica al perineo ovvero esclusivamente dal davanti verso il dietro
- B. Dalla regione perineale verso la regione pubica ovvero esclusivamente dal dietro verso l'avanti
- C. Dalla regione pubica in modo circolare fino ad arrivare al perineo

19. Iniziata la somministrazione di un pasto il paziente inizia a tossire e ad avere una voce modificata, cosa deve fare l'OSS

- A. sospendere l'alimentazione del paziente ed avvisare l'infermiere
- B. non dare alla persona cibi liquidi e continuare con la somministrazione di cibi solidi
- C. non dare alla persona cibi solidi e continuare con la somministrazione di cibi liquidi

20. Con quali delle seguenti scale viene valutato il rischio d'insorgenza di lesioni da decubito dei pazienti?

- A. Norton o Braden
- B. VAS o Painad
- C. Schmidt o Conley

21. La comunicazione non verbale si esprime attraverso:

- A. La postura, l'espressione del volto, lo sguardo, il contatto fisico e la distanza fisica
- B. La postura, l'espressione del volto, il contatto fisico e la semantica utilizzata
- C. La postura, lo sguardo, il contatto fisico, il tono della voce

22. La coprocoltura fornisce informazioni:

- A. sulla presenza di sangue nelle feci
- B. sulla presenza di urina nelle feci
- C. sulla presenza di microrganismi atipici nelle feci

23. Quali tra questi fattori di rischio per la comparsa di lesioni da decubito sono corretti:

- A. decubito su piano rigido, compressione prolungata dei tessuti, sfregamento, ridotta mobilizzazione, contatto prolungato con feci e urine, età avanzata
- B. frequente mobilizzazione del paziente allettato, igiene accurata e controllo dell'integrità della cute, scarsa alimentazione e idratazione, frequenti cambi di posizione
- C. eccessivo apporto di liquidi e solidi, materasso morbido, presenza di pannolone, igiene con detergenti aggressivi, frequente mobilizzazione del paziente

24. Nel determinare un buon rapporto di fiducia concorre:

- A. solo una buona comunicazione
- B. solo la disponibilità all'ascolto
- C. sia una buona comunicazione che la disponibilità all'ascolto

25. Per emottisi si intende:

- A. l'emissione dalla bocca di cospicua quantità di sangue proveniente dalle vie aeree
- B. l'emissione di muco frammisto a tracce di sangue in seguito ad un colpo di tosse proveniente dalle vie respiratorie
- C. l'emissione di sangue con il vomito proveniente dalle vie digerenti superiori

26. L'acronimo R.L.S. significa:

- A. Responsabile Legale della Sicurezza
- B. Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza
- C. Responsabile Locale per la Sicurezza

27. Le funzioni dei carboidrati sono:

- A. energetica, plastica
- B. protettiva, energetica
- C. strutturale, energetica

28. L'acqua è la componente fondamentale di tutti gli organismi viventi. In un uomo adulto costituisce circa il:

- A. 40% del peso corporeo
- B. 50% del peso corporeo
- C. 60% del peso corporeo

29. Cos'è il consenso informato?

- A. L'adesione che il paziente fornisce ai medici curanti riguardo alle proposte diagnostico-terapeutiche che vengono formulate in merito alla sua patologia
- B. L'atto riassuntivo del processo di informazione con il quale vengono forniti i dati relativi alle prestazioni erogate, alle tariffe praticate e alle modalità di accesso ai servizi sanitari di ciascuna Azienda
- C. L'adesione che viene firmata dal paziente in vita riguardo all'espianto dei propri organi dopo la morte

30. Con quali delle seguenti scale viene valutato il dolore?

- A. VAS o Painad
- B. Barthel o Conley
- C. Norton o Braden

