

Prova n.1 04/07/2023 sessione ore 9:30

| Progressivo | Domanda | Risposta Esatta | Risposta 2 | Risposta 3 | Risposta 4 | Risposta 5 |
|-------------|--|--|---|---|---|--|
| 1 | Con il termine "pollachiuria" si intende: | L'elevata frequenza delle minzioni | L'eccessiva quantità di urina prodotta | La perdita involontaria di urina | La minzione difficoltosa e dolorosa | Un'infezione delle vie urinarie |
| 2 | La linea guida è: | Un insieme di raccomandazioni, utili sia agli operatori sanitari, sia ai pazienti, circa il comportamento più appropriato in una determinata situazione clinica | Una descrizione circostanziata della sequenza di azioni che un operatore sanitario deve compiere in un particolare ambito della sua attività professionale | Un insieme di principi generali che il vertice strategico di un'organizzazione emana per orientare l'attività dei propri dipendenti | Uno schema di sequenze comportamentali orientate ad un obiettivo | Nessuna delle risposte è corretta |
| 3 | Tra le seguenti malattie, non è di natura allergica: | La gastrite acuta | La rinite | L'asma bronchiale | L'eczema | Tutte le malattie indicate non sono di natura allergica |
| 4 | Il coenzima necessario per la formazione delle proteine che partecipano ai processi di coagulazione del sangue è la vitamina: | K | A | B | C | D |
| 5 | L'ematemesi indica: | Un episodio di vomito con presenza di sangue | La presenza di sangue occulto nelle feci | L'emorragia rettale massiva | Nessuna delle risposte è corretta | La rottura di capillari delle cavità nasali |
| 6 | Se durante una trasfusione di emazie il paziente manifesta brividi, cefalea e sensazione di calore, è necessario: | Sospendere la trasfusione, mantenere l'accesso venoso con soluzione fisiologica e informare il medico | Diminuire la velocità di trasfusione e rivalutare la situazione dopo 10- 15 minuti | Sospendere la trasfusione, rimuovere l'accesso venoso e informare il medico | Sospendere la trasfusione, rimuovere l'accesso venoso e segnalare il fatto in cartella infermieristica | Diminuire la velocità di trasfusione e informare il medico |
| 7 | Oltre il 90% delle fratture dell'anca nell'anziano è il risultato di: | Una caduta | Fumo | Osteoporosi | Traumi precedenti | Indice di massa corporea basso (BMI < 18,5) |
| 8 | Chi, tra i seguenti soggetti, può essere definito "caregiver": | Il familiare di una persona con demenza di Alzheimer, assistita a domicilio | Il paziente che accede al servizio di pronto soccorso | L'infermiere che svolge attività di ricerca | Lo psicologo del lavoro | L'operatore socio-sanitario che lavora in ospedale |
| 9 | Tra gli esami e le procedure diagnostiche per l'accertamento della funzione cardiovascolare l'angiografia ha lo scopo di: | Visualizzare il flusso ematico nei vasi sanguigni per identificare stenosi | Identificare aritmie cardiache | Ottenere informazioni sul numero di cellule nel sangue | Misurare la pressione cardiaca per determinare la gittata cardiaca | Valutare lo stress cardiovascolare |
| 10 | Quando un individuo sviluppa una diminuzione della risposta all'azione di un farmaco, si parla di: | Tolleranza | Tossicità | Interazione | Effetto collaterale | Reazione da ipersensibilità |
| 11 | La sindrome da immobilizzazione è caratterizzata da alterazioni a carico: | Tutte le risposte sono corrette | Dell'apparato osteo-articolare | Dell'apparato respiratorio | Della cute | Dell'apparato cardio-vascolare |
| 12 | La diagnosi di schizofrenia può porsi in relazione: | A una produzione delirante rigogliosa | A una situazione asintomatica | A un quadro stabile dell'umore, sempre depresso | A un forte aumento dell'affettività | Nessuna delle risposte è corretta |
| 13 | Nell'esame emocromiometrico, il valore normale di emoglobina per una donna adulta sana è: | 12,5-16 g/dl | 13- 17 g/dl | 37- 47 g/dl | 40- 52 g/dl | 16- 20 g/dl |
| 14 | L'apparecchio gessato è uno strumento avente lo scopo di: | Tutte le risposte sono corrette | Immobilizzare e/o ridurre i frammenti ossei conseguenti a frattura | Comprimere i tessuti molli | Permettere la mobilitazione precoce | Proteggere la parte lesa |
| 15 | Indicare quale tra le seguenti indagini strumentali è utilizzata per indagare la disfagia: | Endoscopia a fibre ottiche | RX maxillo-facciale | RMN della testa e collo | Laringoscopia | Ecografia transcranica |
| 16 | La demenza è un disturbo: | Acquisito e con base organica delle funzioni intellettive: memoria (a breve e lungo termine) e almeno una tra pensiero astratto, capacità critica, linguaggio e orientamento spazio-temporale, con conservazione dello stato di coscienza vigile | Congenito delle funzioni motorie e psichiche: linguaggio e almeno una tra pensiero astratto, capacità critica, memoria (a breve lungo termine) orientamento spazio-temporale, con conservazione dello stato di coscienza vigile | Acquisito della memoria breve e lungo termine del linguaggio dell'orientamento spazio-temporale | Congenito delle funzioni psichiche, capacità critica e del linguaggio negli anziani | Delle funzioni motorie, psichiche del linguaggio e della memoria |
| 17 | Qual è la causa più comune della cianosi periferica? | Vasocostrizione generalizzata per esposizione al freddo | Vasodilatazione generalizzata per esposizione al caldo | Riduzione della tensione di ossigeno nel sangue arterioso | Compromissione generale della funzione respiratoria | Esposizione a fonti di calore (superiore a 30 °C) |
| 18 | Quale tra i seguenti non è considerato un fattore di rischio per l'insorgenza di flebite correlata alla presenza di catetere venoso periferico: | Somministrazione di soluzione isotonica | Posizionamento di un catetere venoso periferico in zone di flessione | Somministrazione di soluzione ipertonica | Contaminazione del catetere venoso periferico | Uso di un catetere venoso periferico di calibro maggiore rispetto al lume della vena |
| 19 | L'eritropoietina è: | Un ormone | Un emoderivato | Un enzima inibitore della colinesterasi | Un farmaco per indurre l'ovulazione | Un fattore della coagulazione |
| 20 | Gli interventi di prevenzione secondaria sono volti a: | Identificare precocemente nei soggetti a rischio specifiche malattie | Prevenire l'insorgenza delle malattie e promuovere la salute | Limitare il progredire di una malattia in un gruppo di persone | Prevenire le complicanze di una malattia | Promuovere l'immuno profilassi |
| 21 | Quale delle seguenti funzioni non è svolta dai reni: | Produzione della bile | Regolazione del volume extracellulare | Regolazione del bilancio ionico | Regolazione dell'equilibrio acido-base | Escrezione di cataboliti e tossici ambientali |
| 22 | Il periodo peri-operatorio comprende le fasi: | Pre-operatoria, intra-operatoria, post-operatoria | Pre-operatoria e post-operatoria | Pre-operatoria e intra-operatoria | Pre-operatoria, intra-operatoria, post-operatoria fino alla settima giornata | Pre-rivoco, pre-operatoria, intra-operatoria, post-operatoria |
| 23 | Lo studio descrittivo che esamina un singolo caso è detto: | Case report | Caso controllo | Riassunto di uno studio | Metanalisi | Nessuna delle risposte è corretta |
| 24 | Può essere definito empiema: | Una raccolta di liquido purulento in una cavità preformata del corpo | Una raccolta di sangue nella cavità pleurica | Una raccolta di pus nella cavità peritoneale | Una raccolta di pus denso nel polmone | Una raccolta di liquido purulento in una cavità neoformata del corpo |
| 25 | Quali sistemi di erogazione sono indicati per somministrare ossigeno ad alto flusso? | Maschera di Venturi, maschera con reservoir | Cannula nasale, maschera semplice | Cannula nasale, maschera di Venturi | Maschera semplice, maschera con reservoir | Qualsiasi sistema, quello che conta sono i litri/minuto di ossigeno erogati |
| 26 | Per prevenire l'insorgenza del "piede diabetico" la persona deve essere educata a: | Asciugare bene fra le dita con panno morbido | Ispezionare i piedi due volte alla settimana | Lavare i piedi con acqua molto calda | Tagliare le unghie corte arrotondando gli angoli | Tutte le risposte sono corrette |
| 27 | Quale delle seguenti affermazioni riguardanti le varici esofagee è falsa: | La sintomatologia di esordio comprende il dolore addominale e difficoltà nella deglutizione | Sono dovute a ipertensione portale | Sono a rischio i pazienti affetti da etilismo cronico | Possono essere trattate anche con interventi non chirurgici come la scleroterapia | Possono estendersi anche allo stomaco |
| 28 | La gravità di un'ustione è determinata principalmente da: | Estensione, profondità e sede | Presenza di essudato, sede, agente eziologico | Profondità, presenza di tessuto necrotico, infezioni, grado di rigenerazione | Profondità, presenza di tessuto necrotico, infezioni, grado di rigenerazione | Grado di rigenerazione, estensione, presenza di trasudato |
| 29 | Nell'esecuzione dell'ECG, l'elettrodo per la derivazione precordiale V6 va posizionato: | Nel quinto spazio intercostale sinistro, sulla linea ascellare media | Nel quarto spazio intercostale sinistro, sulla linea emiclavare | Nel quinto spazio intercostale sinistro, sulla linea emiclavare | Nel sesto spazio intercostale sinistro, sulla linea ascellare posteriore | Nel sesto spazio intercostale sinistro, sulla linea emiclavare posteriore |
| 30 | Quali sono le cause della scarsa soddisfazione del sonno notturno in età senile? | Tutte le risposte sono corrette | Aumento del tempo di latenza dell'addormentamento | Aumento del numero e della durata dei risvegli | Aumento della frequenza dei disturbi respiratori (per esempio apnee) | Comparsa del fenomeno dei risvegli parziali brevi |
| 31 | I neurolettici appartengono alla categoria di farmaci: | Antipsicotici | Antidepressivi | Stabilizzatori dell'umore | Ansiolettici | Tutte le risposte sono corrette |
| 32 | Quale tra queste infezioni è veicolata da alimenti: | Tutte le risposte sono corrette | Epatite A | Colera | Amebiasi | Giardiasi |
| 33 | La Glasgow Coma Scale (GCS) è: | Una scala di valutazione della coscienza dopo traumi cranici che utilizza come test l'apertura degli occhi, la risposta verbale e la risposta motoria | Una scala di valutazione del tono muscolare che si utilizza nei pazienti affetti da patologie neurologiche | Una scala di valutazione delle funzioni cognitive nei soggetti con esiti di coma | Un elenco di test che permette di valutare il grado di autonomia acquisita dei pazienti con esiti di neuro lesione centrale | Un test di valutazione del grado di autonomia acquisito dal paziente con esito di trauma cranico nella sfera della comunicazione |
| 34 | Secondo lo studioso Pietro Faglioni, l'aprassia è: | Un disturbo primitivo della funzione motoria consistente nell'incapacità di utilizzare il movimento per l'azione intenzionale | Un disturbo della comunicazione caratterizzato dall'incapacità di esprimere intenzionalmente il nucleo centrale dell'oggetto comunicativo | Un disturbo percettivo dello schema corporeo dei rapporti spaziali tra gli arti e tra gli arti stessi e il tronco | Un disturbo della sensibilità che determina conseguentemente difficoltà motorie dovute alla mancanza di feedback | Un disturbo della memoria, associato a un disorientamento temporale dovuto a lesioni dell'emisfero dominante |
| 35 | Quale dei seguenti meccanismi è svolto dall'insulina per mantenere la glicemia entro valori normali? | L'aumento della sintesi del glicogeno | Attivazione della chetogenesi | Attivazione della lipolisi | Attivazione della gluconeogenesi | Tutte le risposte sono corrette |
| 36 | Una delle principali difficoltà nell'alimentazione del paziente in dialisi è legata alla necessità che la dieta: | Tenga in considerazione l'apporto di sodio per un controllo efficiente della pressione arteriosa | Fornisca un apporto proteico elevato con un apporto di fosforo contenuto | Sia ipoproteica e ipofosforica | Sia iperproteica e con un contenuto di potassio controllato | Segua le linee guida per una corretta alimentazione |
| 37 | Cosa sono le tecnopatie? | Processi morbosi che derivano da un'esposizione protratta a fattori di rischio presenti sul luogo di lavoro | Processi di lavorazione che presentano fattori di rischio per il lavoratore | Processi morbosi che derivano da mutazioni tecnogenetiche | Fattori di rischio presenti sul luogo di lavoro che causano malattie cosiddette professionali | Processi morbosi che comportano l'incapacità di svolgere la normale attività di lavoro |
| 38 | Qual è il volume massimo di liquido che può essere somministrato tramite iniezione intramuscolare nella sede ventrogluteale in un paziente adulto? | 5 ml | 7 ml | 2 ml | 3 ml | 9 ml |
| 39 | Qual è la maggior causa di perdita extrarenale di potassio? | Diarrea | Insufficienza renale | Iperpiressia | Scompenso cardiaco | Shock settico |
| 40 | Per "emianopsia" si intende: | La perdita di metà campo visivo | La perdita totale della vista da un solo occhio | La paralisi omolaterale dei muscoli oculari | La paralisi bilaterale dei muscoli oculari | Una forma di diplopia che colpisce un solo occhio |