DIABETE

INDICAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI E/O PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI SPECIFICI NEL DIABETE TIPO 1 IN ORARIO SCOLASTICO
(come da DGR 50-7641 del 21/05/2014)

PARTE 1 – TERAPIA MULTIINIETTIVA/MICROINFUSORE

IL MINORE _____

NATO A _____ IL _____

RESIDENTE A _____ IN VIA _____

affetto da Diabete tipo 1
è attualmente in terapia insulinica intensiva con _____

Il paziente è portatore di monitoraggio continuo della glicemia si no
Il paziente è portatore di microinfusore si no

Presenta la necessità che ***in ambito ed orario scolastico/formativo*** venga somministrata la seguente terapia insulinica:

PASTI	FARMACO	DOSE FISSA	DOSE CON CALCOLO

Modalità di conservazione dell'insulina in uso: temperatura ambiente.
L'eventuale insulina di scorta va invece conservata tra 4 e 8 gradi.

Si sottolinea che tale schema può essere soggetto a variazioni (anche quotidiane) da parte della famiglia o del medico.
I genitori del paziente sono stati correttamente istruiti su tutta la gestione terapeutica del diabete e SONO / NON SONO Idonei a dare indicazioni sulle variazioni della terapia.

Si sottolinea che i tutor scolastici non possono somministrare farmaci sulla base di discrezionalità tecnica, e che quindi la posologia deve essere già predefinita da certificazione medica, o comunque contenuta entro range pre-definiti.

In caso contrario, e cioè in assenza dell'indicazione di una dose fissa o di un range predefinito, l'eventuale calcolo necessario per individuare la dose di insulina da somministrare è a carico del genitore.

Si precisa tuttavia che nella fase di formazione dei tutor scolastici, il personale sanitario formatore fa riferimento esclusivamente al dosaggio fisso/range pre-definito riportato sul certificato/prescrizione.

DIABETE**PARTE 2 - GESTIONE DELL'IPOGLICEMIA**

Occasionalmente si può verificare un episodio di ipoglicemia anche durante la giornata (glicemia ≤ 70 mg/dl) e quindi anche durante l'orario scolastico, eventualmente associata a sintomatologia.

In presenza di allarme del sensore per ipoglicemia (se presente) o di sintomi (fame eccessiva, irritabilità, sudorazione, pianto, pallore, confusione, mal di testa, difficoltà di concentrazione, vertigini, affaticamento, tremori, vista annebbiata, dolori addominali o nausea) è indicato:

- eseguire una determinazione della glicemia capillare;
- in caso di riscontro di glicemia inferiore o uguale a 70 mg/dl è necessario:
 - 1) somministrare ____ bustina/e di zucchero da 5 gr o glucosio (____ fiala/e Glucosprint)
 - 2) ricontrollare la glicemia dopo 15 – 20 minuti, eventualmente da sensore:
 - a) se ≥ 80 mg/dl o la freccia del sensore è rivolta verso l'alto, l'ipoglicemia è risolta;
 - b) se < 80 mg/dl, assumere nuovamente ____ bustina/e di zucchero o glucosio.

In caso di IPOGLICEMIA GRAVE (perdita di coscienza, crisi convulsiva, emiparesi transitoria) deve essere immediatamente somministrato GLUCAGONE:

nome farmaco _____

alla dose: _____

per via _____

Contestualmente devono essere attivati i soccorsi – 112 ,e poi devono essere avvisati i genitori.

Modalità di conservazione del farmaco: può essere conservato a temperatura ambiente.

DATA _____

TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO