

UROCOLTURA

Una concomitante terapia con antibiotici può rendere inattendibile l'esito dell'esame

Materiale per la raccolta

Contenitore con tappo a vite e sistema di aspirazione per provetta dedicata

Sacchetto di plastica adesivo, sterile (per i pazienti pediatrici)

Modalità di raccolta

Lavare accuratamente i genitali esterni

Urinare scartando il primo getto

Raccogliere il getto intermedio nel contenitore con tappo a vite e sistema di aspirazione

Chiudere accuratamente il contenitore

Sacchetto di plastica adesivo, sterile (per i pazienti pediatrici)

Lavare la regione sovrapubica, perianale e dei genitali esterni con soluzione detergente, risciacquare, asciugare

Applicare il sacchetto facendolo aderire bene al perineo e alla regione sovra pubica

Appena avviene la minzione rimuovere il sacchetto, versare l'urina nel contenitore sterile

Nel caso che la minzione non avvenga dopo 45 - 60 minuti dall'applicazione del sacchetto, esso deve essere rimosso, nuova detersione, applicazione di un nuovo sacchetto

Cateteri a permanenza

Clampare il sistema di drenaggio a valle del dispositivo in lattice per il tempo necessario alla raccolta e disinfettare il dispositivo in lattice per il prelievo

Aspirare con siringa ed ago di piccolo calibro 10 ml di urina dal dispositivo di prelievo

Immettere l'urina prelevata nel contenitore sterile

Riaprire il sistema di drenaggio

Non raccogliere l'urina dalla sacca di raccolta o sconnettendo il catetere.

Catetere estemporaneo

Fare un'accurata pulizia dei genitali esterni

Inserire il catetere nell'uretra

Le urine devono essere rimaste in vescica per almeno quattro ore

Scartare il primo getto di urine, raccogliere il secondo getto nel contenitore sterile.

Puntura sovra pubica

L'urina è raccolta dal medico con puntura sovra pubica con siringa e successiva immissione nel contenitore sterile.

Urine da stomia

Fare una pulizia molto accurata dello stoma con sapone ed abbondante risciacquo senza usare sostanze antisettiche

Inserire un catetere sterile all'interno della stomia, scartare il primo getto di urine e raccogliere il secondo getto nel contenitore sterile.

Inviare al più presto in laboratorio

